

# 新型コロナウイルス感染症に係る健康観察票

【 月】

感染症対策のため、毎日の健康観察をお願いします。登校前に体温を測り、当てはまる症状に○をつけてください。  
 健康観察の結果、37.0℃以上の発熱(平熱が37℃の場合を除く)や一つでも当てはまる症状がある場合は自宅で休養してください。この用紙は自宅で保管してください。  
 ※新型コロナウイルス感染症にかかった場合、また、保健所等から「濃厚接触者」の疑いがあると連絡があった際は、速やかに学校に連絡してください。

大宮中央高校 通信制			生徒番号	氏名		
日付	曜日	体温	呼吸器症状	その他の症状	濃厚接触者※	備考
1		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
2		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
3		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
4		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
5		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
6		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
7		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
8		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
9		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
10		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
11		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
12		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
13		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
14		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	
15		℃	せき・息苦しさ・鼻水 鼻づまり・のどの痛み	吐き気・嘔吐・目が赤い・頭痛・だるさ 関節の痛み・下痢・意識障害・けいれん その他( )	該当・非該当	

